

# Matematika Mérnököknek 1.

Baran Ágnes

Gyakorlat

Vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek

## Feladat

1. Legyen

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 + i \\ 2i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} + i \\ i^2 - 3i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} i - 1 \\ i - 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

*Számítsa ki az alábbi kifejezések értékét!*

$$\mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad -5\mathbf{c}, \quad 12\mathbf{a} + 4\mathbf{b}, \quad 3\mathbf{c} + \mathbf{d}, \quad \|\mathbf{b}\|, \quad \|\mathbf{c} + \mathbf{d}\|, \quad \mathbf{u} - i\mathbf{v},$$

$$(3 + 2i)\mathbf{w} - i\mathbf{z}, \quad \mathbf{v} - 3i\mathbf{u}, \quad \|\mathbf{w}\|, \quad \|\mathbf{z}\|, \quad \|i\mathbf{z} + \mathbf{w}\|.$$

## Feladatok

2. *Határozza meg az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  vektorok által bezárt szöget!*

(a)  $\mathbf{a}^T = (2, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (1, 3)$

(b)  $\mathbf{a}^T = (3, \sqrt{3})$ ,  $\mathbf{b}^T = (2, 0)$

(c)  $\mathbf{a}^T = (1, 3, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-4, -2, 0)$

(d)  $\mathbf{a}^T = (-2, 3, 4)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-6, -4, 2)$

## Feladatok

2. *Határozza meg az  $\mathbf{a}$  és  $\mathbf{b}$  vektorok által bezárt szöget!*

(a)  $\mathbf{a}^T = (2, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (1, 3)$

(b)  $\mathbf{a}^T = (3, \sqrt{3})$ ,  $\mathbf{b}^T = (2, 0)$

(c)  $\mathbf{a}^T = (1, 3, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-4, -2, 0)$

(d)  $\mathbf{a}^T = (-2, 3, 4)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-6, -4, 2)$

3. *Adja meg úgy  $\lambda$ -t, hogy az  $\mathbf{a}$  vektor merőleges legyen  $\mathbf{b}$ -re!*

(a)  $\mathbf{a}^T = (1, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-2, \lambda)$

(b)  $\mathbf{a}^T = (4, 2, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-4, -2, \lambda)$

(c)  $\mathbf{a}^T = (1, 2, 1, 1)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-4, -2, 2, \lambda)$

(d)  $\mathbf{a}^T = (1, \lambda, \lambda)$ ,  $\mathbf{b}^T = (-3, -2, \lambda)$

## Feladatok

4. *Mutassa meg, hogy az  $(1, 2)$ ,  $(-3, 2)$  vektorok lineárisan függetlenek  $\mathbb{R}^2$ -ben!*

## Feladatok

4. Mutassa meg, hogy az  $(1, 2)$ ,  $(-3, 2)$  vektorok lineárisan függetlenek  $\mathbb{R}^2$ -ben!

5. Állapítsa meg, hogy lineárisan függetlenek-e  $\mathbb{R}^3$ -ban az alábbi vektorrendszerek!

(a)  $v_1 = (1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (1, 1, 1)$ ,

(b)  $v_1 = (1, 0, 0)$ ,  $v_2 = (0, 1, 0)$ ,  $v_3 = (1, 1, 1)$ ,

(c)  $v_1 = (1, 2, 2)$ ,  $v_2 = (-1, -1, 3)$ ,  $v_3 = (2, 3, 0)$ ,

(d)  $v_1 = (1, 1, 2)$ ,  $v_2 = (2, 3, -1)$ ,  $v_3 = (-1, 2, -17)$ ,

(e)  $v_1 = (1, 1, 2)$ ,  $v_2 = (-2, -2, -4)$ ,

(f)  $v_1 = (-1, 2, 1)$ ,  $v_2 = (2, -3, 1)$ ,  $v_3 = (1, 1, 2)$

## Feladatok

6. *Határozza meg a*

(a)  $(1, 0), (0, 1),$

(d)  $(3, 2),$

(b)  $(-2, 0), (0, 1),$

(e)  $(1, 2), (3, 1),$

(c)  $(1, -2), (2, -4),$

(f)  $(1, 0), (2, -4), (0, 2).$

*vektorok által generált alteret  $\mathbb{R}^2$ -ben!*

## Feladatok

6. *Határozza meg a*

(a)  $(1, 0), (0, 1),$

(d)  $(3, 2),$

(b)  $(-2, 0), (0, 1),$

(e)  $(1, 2), (3, 1),$

(c)  $(1, -2), (2, -4),$

(f)  $(1, 0), (2, -4), (0, 2).$

*vektorok által generált alteret  $\mathbb{R}^2$ -ben!*

7. *Határozza meg a*

(a)  $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1),$

(d)  $(0, 0, 1),$

(b)  $(1, 0, 0), (0, 1, 0),$

(e)  $(1, 1, 1), (0, 0, 1), (0, 1, 0),$

(c)  $(1, 1, 0), (0, 1, 0),$

(f)  $(1, 0, 0), (2, 2, 0), (0, -1, 0).$

*vektorok által generált alteret  $\mathbb{R}^3$ -ban!*

## Feladat

8. Legyen

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} \pi \\ i-1 \\ 3-2i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1+i \\ -1-i \\ \lambda \end{pmatrix},$$

és

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

Számítsa ki  $B\mathbf{a}$ ,  $B\mathbf{b}$ ,  $A\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{x}^T B$ ,  $\mathbf{v}^T \mathbf{d}$ ,  $C\mathbf{w}$ ,  $\mathbf{w}^T C \mathbf{d} \mathbf{a}^T$ ,  $\mathbf{b}^T B$ ,  $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{a} \mathbf{b}^T$ ,  $\mathbf{w}^T \mathbf{w}$ ,  $\mathbf{w} \mathbf{w}^T$  értékét!

## Feladat

9. Tekintsük a következő valós mátrixokat:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & -5 \end{pmatrix},$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Számítsa ki a következő kifejezések értékét!

$$A + B, \quad -3B, \quad 2A + 3C, \quad A^T, \quad B^T, \quad C^T, \quad (A + B)^T, \quad (3B)^T, \\ AB, \quad BA, \quad AE, \quad EA, \quad AC, \quad A(B + C), \quad C(2A - B), \quad A^T A, \\ FG, \quad 2F - 3G, \quad F^T - G, \quad G + 2F^T, \quad G^2 - 2FG + F^2, \quad (G - F)^2$$

## Feladat

10. Számítsa ki az alábbi mátrixok determinánsát és az inverzüket, amennyiben léteznek!

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 7 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

## Feladat

11. Számítsa ki az alábbi mátrixok determinánsát!

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & 3 & 19 \\ 8 & -11 & -34 \\ -5 & 7 & 21 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

## Feladatok

12. Oldja meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket!

(a)

$$x_1 - 2x_2 = 6$$

$$3x_1 - x_2 = 13$$

(c)

$$-x_1 - 5x_2 = 7$$

$$4x_1 - 3x_2 = -5$$

(e)

$$2x_1 - x_2 = -4$$

$$6x_1 - 3x_2 = 9$$

(b)

$$2x_1 - 3x_2 = 1$$

$$4x_1 - x_2 = 7$$

(d)

$$-3x_1 + 2x_2 = -4$$

$$6x_1 - 4x_2 = 8$$

(f)

$$-2x_1 - 5x_2 = 3$$

$$x_1 - 3x_2 = 4$$

13. Írja fel az előző feladatban adott lineáris egyenletrendszereket  $Ax = b$  alakban!

## Példa

*Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert!*

$$-2x_1 - x_2 + 4x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$

$$-4x_1 - 10x_2 - 5x_3 = -12$$

## Példa

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert!

$$-2x_1 - x_2 + 4x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$

$$-4x_1 - 10x_2 - 5x_3 = -12$$

**Megoldás.** Felírható  $Ax = b$  alakban, ahol

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -12 \end{pmatrix}$$

## Gauss-elimináció:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -4 & -10 & -5 & -12 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{II.}+I. \\ \text{III.}-2*I.}} \left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -8 & -13 & -18 \end{array} \right)$$

## Gauss-elimináció:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -4 & -10 & -5 & -12 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{II.}+I. \\ \text{III.}-2*I.}} \left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -8 & -13 & -18 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\text{III.}+4*II.} \left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

Gauss-elimináció:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -4 & -10 & -5 & -12 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{II.}+I. \\ \text{III.}-2*I.}} \left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -8 & -13 & -18 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\text{III.}+4*II.} \left( \begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

A visszahelyettesítés:

$$\begin{aligned} -x_3 &= -2 & \rightarrow & x_3 = 2 \\ 2x_2 + 3x_3 &= 4 & \rightarrow & x_2 = -1 \\ -2x_1 - x_2 + 4x_3 &= 3 & \rightarrow & x_1 = 3 \end{aligned}$$

**Megj.:** Azt is látjuk, hogy  $\det(A) = (-2) \cdot 2 \cdot (-1) = 4$

## Feladat

13. Oldja meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert és számolja ki  $\det(A)$ -t, ha

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -6 & -7 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & 1 \\ 6 & 1 & -9 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -28 \\ -7 \\ -23 \\ 8 \end{pmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{pmatrix} -12 & 10 & -1 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & -2 \\ -9 & 2 & -12 & -2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ -4 \\ 29 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -8 & -3 \\ -3 & 11 & 10 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -21 \\ 47 \\ 17 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.**

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & -9 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{I.} \leftrightarrow \text{II.}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -9 \\ -1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c}
 \text{II.} + 2 \cdot \text{I.} \\
 \text{III.} - \text{I.} \\
 \text{IV.} + \text{I.} \\
 \longrightarrow
 \end{array}
 \left( \begin{array}{ccc|c}
 -1 & -2 & 1 & 1 \\
 2 & 0 & 1 & -9 \\
 -1 & 2 & -1 & 4 \\
 1 & 6 & -3 & 4
 \end{array} \right)
 \longrightarrow
 \left( \begin{array}{ccc|c}
 -1 & -2 & 1 & 1 \\
 0 & -4 & 3 & -7 \\
 0 & 4 & -2 & 3 \\
 0 & 4 & -2 & 5
 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -9 \\ -1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{II.}+2*\text{I.} \\ \text{III.}-\text{I.} \\ \text{IV.}+\text{I.}}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -7 \\ 0 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -2 & 5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{III.}+\text{II.} \\ \text{IV.}+\text{II.}}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & | & 1 \\ 2 & 0 & 1 & | & -9 \\ -1 & 2 & -1 & | & 4 \\ 1 & 6 & -3 & | & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II.}+2*\text{I.} \\ \text{III.}-\text{I.} \\ \text{IV.}+\text{I.}}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & -4 & 3 & | & -7 \\ 0 & 4 & -2 & | & 3 \\ 0 & 4 & -2 & | & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{III.}+\text{II.} \\ \text{IV.}+\text{II.} \\ \longrightarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & -4 & 3 & | & -7 \\ 0 & 0 & 1 & | & -4 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{IV.}-\text{III.}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & -4 & 3 & | & -7 \\ 0 & 0 & 1 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -9 \\ -1 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{II.}+2*\text{I.} \\ \text{III.}-\text{I.} \\ \text{IV.}+\text{I.}}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -7 \\ 0 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -2 & 5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{III.}+\text{II.} \\ \text{IV.}+\text{II.}}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{IV.}-\text{III.}} \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Az egyenletrendszer nem megoldható, mivel a kibővített mátrix rangja nagyobb, mint az alaplátrix rangja.

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ -6 & 1 & -8 & -13 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ -6 & 1 & -8 & -13 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.**

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ -6 & 1 & -8 & -13 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II.}+3\text{*I.}} \left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ -6 & 1 & -8 & -13 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \end{pmatrix}$$

### Megoldás.

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ -6 & 1 & -8 & -13 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II.}+3\text{I.}} \left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

A 2. egyenlet azt jelenti, hogy 3 ismeretlenre csak 1 korlátozó feltételünk van, így bevezetünk 2 szabad paramétert:

$$x_3 = t, \quad x_4 = s, \quad \text{ahol } t, s \in \mathbb{R}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

$$x_3 = t, \quad x_4 = s, \quad \text{ahol } t, s \in \mathbb{R}$$

A 2. egyenletből:

$$x_2 = 3 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}s$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

$$x_3 = t, \quad x_4 = s, \quad \text{ahol } t, s \in \mathbb{R}$$

A 2. egyenletből:

$$x_2 = 3 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}s$$

Az 1. egyenletből:

$$x_1 = \frac{7}{2} - \frac{5}{2}t - \frac{9}{2}s$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -6 \end{array} \right)$$

$$x_3 = t, \quad x_4 = s, \quad \text{ahol } t, s \in \mathbb{R}$$

A 2. egyenletből:

$$x_2 = 3 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}s$$

Az 1. egyenletből:

$$x_1 = \frac{7}{2} - \frac{5}{2}t - \frac{9}{2}s$$

Az egyenletrendszer megoldása tehát:

$$x = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ahol } t, s \in \mathbb{R}$$

## Feladat

14. Oldja meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -9 & 14 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & 0 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \\ 8 & -12 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

## Feladat

15. Oldja meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket Gauss-eliminációval!

(a)

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 7x_4 &= 15 \\ 3x_1 - 4x_2 - x_3 - 8x_4 &= -19 \\ x_1 - 6x_2 - 3x_3 + 8x_4 &= 17 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} -6x_1 + 7x_2 - 2x_3 + 8x_4 &= 1 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= -1 \\ 6x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 5x_4 &= 5 \\ 2x_1 + 3x_3 + 6x_4 &= 17 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} -6x_1 + 7x_2 - 2x_3 + 8x_4 &= 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= 0 \\ 6x_1 - 6x_2 - 5x_4 &= 2 \\ 2x_1 - 3x_3 + 6x_4 &= 14 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 &= -1 \\ 8x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 6x_4 &= 1 \\ 6x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 5 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 + 4x_4 &= 17 \end{aligned}$$

## Feladat

(e)

$$-x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2$$

$$2x_1 - 8x_2 - 3x_4 = 4$$

$$-5x_1 + 17x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 1$$

(f)

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2$$

$$2x_1 - 6x_2 - 2x_3 = 12$$

$$-5x_1 + 12x_2 + 9x_3 = -20$$

$$-13x_1 + 32x_2 + 25x_3 = -52$$

(g)

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2$$

$$-2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 4$$

$$5x_1 - 8x_2 - 21x_3 = 0$$

$$5x_1 - 4x_2 - 29x_3 = -17$$

(h)

$$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1$$

(i)

$$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$$

## Feladat

16. *Határozza meg az alábbi mátrixok inverzét!*

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ -6 & 1 & -4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & -5 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 6 & -1 & 6 \\ -9 & 1 & -11 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -3 & 8 & -12 & -4 \\ 0 & -2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

# Vektorok Matlab-ban

Megkülönbözteti a sor- és oszlopvektorokat

## Sorvektorok

Az  $a = (-1.2, 3.1, 4.7, 1.9)$  vektor megadása elemei felsorolásával:

- az elemeket vesszővel választjuk el:

$$a = [-1.2, 3.1, 4.7, 1.9]$$

- vagy az elemeket szóközzel választjuk el:

$$a = [-1.2 3.1 4.7 1.9]$$

A vektorkoordináták számozása 1-gyel kezdődik,  $a(i)$  az  $a$  vektor  $i$ -edik koordinátája.

`length(a)` az  $a$  vektor koordinátáinak száma

`a=[]` üres vektor

# Vektorok, mint szabályos sorozatok

## A kettőspont operátorral

- a  $b = (1, 2, 3, 4, 5)$  vektor:

$$b = 1:5$$

- a  $c = (5, 4, 3, 2, 1)$  vektor:

$$c = 5:-1:1$$

- a  $d = (2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3)$  vektor

$$d=2:0.2:3$$

## Általában:

$$x=elsoelem:lepeskoz:utolsoelem$$

ahol a lépésköz negatív is lehet, vagy

$$x=elsoelem:utolsoelem$$

ekkor a lépésköz 1.

# Vektorok, mint szabályos sorozatok

## A linspace függvénnyel:

- az  $e = (1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2)$  vektor  
`e=linspace(1,2,6)`
- egy 100 koordinátából álló  $f$  vektor  
`f=linspace(1,2)`

## Általában:

`x=linspace(elsoelem,utolsoelem,elemekszama)`

ahol a koordináták egyforma lépésközzel követik egymást, vagy

`x=linspace(elsoelem,utolsoelem)`

akkor a koordináták száma 100.

# Oszlopvektorok

## Oszlopvektorok megadása

- elemeinek felsorolásával (a vektor koordinátáit pontosvesszővel választjuk el)

$$m = [-3; 0; 7]$$

# Oszlopvektorok

## Oszlopvektorok megadása

- elemeinek felsorolásával (a vektor koordinátáit pontosvesszővel választjuk el)

$$m = [-3; 0; 7]$$

- egy sorvektor transzponálásával:  $n = [1 \ -2 \ 4 \ -1]'$   
(**valójában a ' jel konjugált transzponáltat eredményez, a konjugálás nélküli transzponátás:  $a.'$  vagy  $\text{transpose}(a)$** )

## Oszlopvektorok megadása

- elemeinek felsorolásával (a vektor koordinátáit pontosvesszővel választjuk el)

$$m = [-3; 0; 7]$$

- egy sorvektor transzponálásával:  $n = [1 \ -2 \ 4 \ -1]'$   
(**valójában a ' jel konjugált transzponáltat eredményez, a konjugálás nélküli transzponátás:  $a.'$  vagy  $\text{transpose}(a)$** )

$x(i)$  és  $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor  $i$ -edik koordinátája és az  $x$  vektor koordinátáinak száma (ugyanúgy mint a sorvektoroknál)

$\text{size}(x)$  az  $x$  vektor mérete (sorvektoroknál az  $[1 \ \text{length}(x)]$  vektor, oszlopvektoroknál a  $[\text{length}(x) \ 1]$  vektor)

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m; n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m; n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m;n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1;m;-3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m; n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1; m; -3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel
- $h(2:4)$  a  $h$  vektor 2., 3. és 4. koordinátájából álló vektor

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m;n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1;m;-3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel
- $h(2:4)$  a  $h$  vektor 2., 3. és 4. koordinátájából álló vektor
- $h([1 \ 4 \ 5])$  a  $h$  vektor 1., 4. és 5. koordinátájából álló vektor

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m;n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1;m;-3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel
- $h(2:4)$  a  $h$  vektor 2., 3. és 4. koordinátájából álló vektor
- $h([1 \ 4 \ 5])$  a  $h$  vektor 1., 4. és 5. koordinátájából álló vektor
- $h(2)=[ ]$  elhagyja a  $h$  vektor 2. koordinátáját

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m;n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1;m;-3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel
- $h(2:4)$  a  $h$  vektor 2., 3. és 4. koordinátájából álló vektor
- $h([1 \ 4 \ 5])$  a  $h$  vektor 1., 4. és 5. koordinátájából álló vektor
- $h(2)=[ ]$  elhagyja a  $h$  vektor 2. koordinátáját
- $h([2 \ 4])=[ ]$  elhagyja a  $h$  vektor 2. és 4. koordinátáját

# Vektorok konstruálása más vektorokból

- $[a \ b]$  két sorvektor egymás után fűzése
- $[m;n]$  két oszlopvektor egymás után fűzése
- $[-4 \ a \ 3 \ -1]$  sorvektor bővítése újabb elemekkel
- $[1;m;-3]$  oszlopvektor bővítése újabb elemekkel
- $h(2:4)$  a  $h$  vektor 2., 3. és 4. koordinátájából álló vektor
- $h([1 \ 4 \ 5])$  a  $h$  vektor 1., 4. és 5. koordinátájából álló vektor
- $h(2)=[ ]$  elhagyja a  $h$  vektor 2. koordinátáját
- $h([2 \ 4])=[ ]$  elhagyja a  $h$  vektor 2. és 4. koordinátáját

**Fontos!** Ha  $a=[-1 \ 3 \ 2]$  akkor az  $a(6)=4$  utasítás eredménye az  $a=[-1 \ 3 \ 2 \ 0 \ 0 \ 4]$  vektor (a legkisebb olyan vektor, amelyben van értelme a  $a(6)=4$  utasításnak, a nemdefiniált elemeket 0-kal tölti fel. **Megváltozik a vektor mérete, erre nem figyelmeztet!**)

# Néhány hasznos függvény

- $\min(\mathbf{x})$  és  $\max(\mathbf{x})$  az  $\mathbf{x}$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme

# Néhány hasznos függvény

- $\min(\mathbf{x})$  és  $\max(\mathbf{x})$  az  $\mathbf{x}$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(\mathbf{x})$  az  $\mathbf{x}$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma
- $\text{sum}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek összege

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma
- $\text{sum}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek összege
- $\text{prod}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek szorzata

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma
- $\text{sum}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek összege
- $\text{prod}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek szorzata
- $\text{mean}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek átlaga

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma
- $\text{sum}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek összege
- $\text{prod}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek szorzata
- $\text{mean}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek átlaga
- $x(3)$  az  $x$  vektor harmadik eleme

# Néhány hasznos függvény

- $\min(x)$  és  $\max(x)$  az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- $\text{sort}(x)$  az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- $\text{sort}(x, 'descend')$  az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- $\text{flip}(x)$  az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- $\text{length}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek a száma
- $\text{sum}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek összege
- $\text{prod}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek szorzata
- $\text{mean}(x)$  az  $x$  vektor elemeinek átlaga
- $x(3)$  az  $x$  vektor harmadik eleme
- $x(1:3)$  az  $x$  vektor első három eleme

# Néhány hasznos függvény

- `min(x)` és `max(x)` az  $x$  vektor legkisebb és legnagyobb eleme
- `sort(x)` az  $x$  elemeit növekvő sorrendbe rendezi
- `sort(x, 'descend')` az  $x$  elemeit csökkenő sorrendbe rendezi
- `flip(x)` az  $x$  elemeit fordított sorrendben sorolja fel
- `length(x)` az  $x$  vektor elemeinek a száma
- `sum(x)` az  $x$  vektor elemeinek összege
- `prod(x)` az  $x$  vektor elemeinek szorzata
- `mean(x)` az  $x$  vektor elemeinek átlaga
- `x(3)` az  $x$  vektor harmadik eleme
- `x(1:3)` az  $x$  vektor első három eleme
- `x(3:end)` az  $x$  vektor minden elemei a harmadiktól az utolsóig

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a \cdot 2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a.^2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .
- $x=a.*b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = a_i b_i$

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a.^2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .
- $x=a.*b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = a_i b_i$
- $x=a./b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = \frac{a_i}{b_i}$

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a.^2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .
- $x=a.*b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = a_i b_i$
- $x=a./b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = \frac{a_i}{b_i}$
- $x=1./a$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = \frac{1}{a_i}$

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a.^2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .
- $x=a.*b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = a_i b_i$
- $x=a./b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = \frac{a_i}{b_i}$
- $x=1./a$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = \frac{1}{a_i}$
- $\text{dot}(a,b)$  az  $a$  és  $b$  skaláris szorzata

# Műveletek vektorokkal

Ha  $a$  és  $b$  két ugyanolyan méretű vektor, akkor

- $a+b$  ill.  $a-b$  a két vektor összege és különbsége
- $x=a+1$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i + 1$
- $x=a.^2$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = a_i^2$ .
- $x=a.*b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = a_i b_i$
- $x=a./b$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$  és  $b$ ,  $x_i = \frac{a_i}{b_i}$
- $x=1./a$  egy ugyanolyan méretű vektor mint  $a$ ,  $x_i = \frac{1}{a_i}$
- $\text{dot}(a,b)$  az  $a$  és  $b$  skaláris szorzata

**Fontos!** A műveleti jel előtti pont a művelet elemenkénti végrehajtását eredményezi

$\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ,  $\exp$ ,  $\log$ ,  $\text{sqrt}$ ,  $\text{abs}$ ,  $\text{stb.}$  mind elemenként hajtódik végre.

$\text{NaN}$  : Not a Number (pl.  $0/0$ ,  $\text{Inf}/\text{Inf}$ )

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

(2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

(2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$

(3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

(2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$

(3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$

(4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

(2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$

(3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$

(4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$

(5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!

(1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$

(2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$

(3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$

(4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$

(5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$

(6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,
  - (2) az  $x$  vektor első 5 eleme,

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,
  - (2) az  $x$  vektor első 5 eleme,
  - (3) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  4. elemét

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,
  - (2) az  $x$  vektor első 5 eleme,
  - (3) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  4. elemét
  - (4) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  5., 72. és 93. elemét

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,
  - (2) az  $x$  vektor első 5 eleme,
  - (3) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  4. elemét
  - (4) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  5., 72. és 93. elemét
  - (5) az  $x$  vektor páratlan sorszámú elemei

## Feladatok

- Az elemek egyenkénti begépelése nélkül állítsa elő az alábbi vektorokat!
  - (1)  $a = (0, 1, \dots, 30)$
  - (2)  $b = (2, 4, 6, \dots, 100),$
  - (3)  $c = (2, 1.9, 1.8, \dots, 0.1, 0)$
  - (4)  $d = (0, 3, 6, \dots, 27, 30, -100, 30, 27, \dots, 6, 3, 0)$
  - (5)  $e = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{20}\right)$
  - (6)  $f = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{19}{20}\right)$
- Legyen  $x$  egy adott 100 elemű sorvektor. Az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek elemei
  - (1) az  $x$  vektor elemei fordított sorrendben felsorolva,
  - (2) az  $x$  vektor első 5 eleme,
  - (3) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  4. elemét
  - (4) az  $x$  vektor elemei ugyanolyan sorrendben, kivéve az  $x$  5., 72. és 93. elemét
  - (5) az  $x$  vektor páratlan sorszámú elemei
  - (6) az  $x$  vektor 2., 5., 17. és 81. eleme.

## Feladatok

Legyen  $x$  egy adott sorvektor. A `for` utasítás használata nélkül az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek  $i$ -edik eleme

$$(1) \quad x(i) + 2$$

## Feladatok

Legyen  $x$  egy adott sorvektor. A `for` utasítás használata nélkül az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek  $i$ -edik eleme

(1)  $x(i) + 2$

(2)  $x(i)^2$

## Feladatok

Legyen  $x$  egy adott sorvektor. A `for` utasítás használata nélkül az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek  $i$ -edik eleme

(1)  $x(i) + 2$

(2)  $x(i)^2$

(3)  $1/x(i)$

## Feladatok

Legyen  $x$  egy adott sorvektor. A `for` utasítás használata nélkül az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek  $i$ -edik eleme

(1)  $x(i) + 2$

(2)  $x(i)^2$

(3)  $1/x(i)$

(4)  $\sin(x(i)^3 - 1)$

## Feladatok

Legyen  $x$  egy adott sorvektor. A `for` utasítás használata nélkül az  $x$  vektorból állítsa elő azt az  $y$  vektort, melynek  $i$ -edik eleme

(1)  $x(i) + 2$

(2)  $x(i)^2$

(3)  $1/x(i)$

(4)  $\sin(x(i)^3 - 1)$

(5)  $x(i) - i$

# Mátrixok Matlab-ban

## Mátrix megadása elemenként

$A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]$  vagy  $A = [1 \ 2 \ 3; \ 4 \ 5 \ 6; \ 7 \ 8 \ 9]$   
eredménye:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

(Az egy sorban álló elemeket vesszővel vagy szóközzel, a sorokat pontosvesszővel választjuk el.)

# Mátrixok Matlab-ban

## Mátrix megadása elemenként

$A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]$  vagy  $A = [1 \ 2 \ 3; \ 4 \ 5 \ 6; \ 7 \ 8 \ 9]$   
eredménye:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

(Az egy sorban álló elemeket vesszővel vagy szóközzel, a sorokat pontosvesszővel választjuk el.)

A mátrixelemek számozása (1, 1)-gyel kezdődik.

$A(i, j)$  a mátrix  $(i, j)$ -edik eleme.

# Mátrixok megadása

## Vektorok összefűzésével

Ha  $a=[1 \ -2 \ 0]$ ;  $b=[2 \ -11 \ 7]$ ;  $m=[-3;0;7]$ ;  $n=[1; \ -2; \ 0]$ ; akkor  $B=[a;b]$  eredménye:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -11 & 7 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok megadása

## Vektorok összefűzésével

Ha  $a=[1 \ -2 \ 0]$ ;  $b=[2 \ -11 \ 7]$ ;  $m=[-3;0;7]$ ;  $n=[1; \ -2; \ 0]$ ; akkor  $B=[a;b]$  eredménye:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -11 & 7 \end{pmatrix}$$

$C=[a' \ b']$  és  $D=[m \ n]$  eredménye:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -11 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok bővítése

Az előbb definiált mátrixokkal, vektorokkal:  
 $E=[A; a]$  vagy  $E=[A; [1, -2, 0]]$  eredménye

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tehát: [mátrix „sortörés” (azaz ;) sorvektor]

# Mátrixok bővítése

Az előbb definiált mátrixokkal, vektorokkal:

$E=[A; a]$  vagy  $E=[A; [1, -2, 0]]$  eredménye

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tehát: [mátrix „sortörés” (azaz ;) sorvektor]

Az  $F=[A \ m]$  vagy  $F=[A, \ m]$  eredménye

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -3 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Tehát: [mátrix szóköz vagy vessző oszlopvektor]

# Mátrixok bővítése

$G=[C \ D]$  és  $H=[C;D]$  eredménye

$$G = \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -3 & 1 \\ -2 & -11 & 0 & -2 \\ 0 & 7 & 7 & 0 \end{array} \right)$$

$$H = \left( \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ -2 & -11 \\ 0 & 7 \\ -3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 7 & 0 \end{array} \right)$$

## Mátrixok bővítése

$G=[C \ D]$  és  $H=[C;D]$  eredménye

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ -2 & -11 & 0 & -2 \\ 0 & 7 & 7 & 0 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -11 \\ 0 & 7 \\ -3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$C(4,5)=9$  eredménye:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

**Megváltozik a mátrix mérete, erre nem figyelmeztet!**

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- $\text{size}(A)$  az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár: `max(size(A))`

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár:  $\max(\text{size}(A))$
- `A(i,j)` az  $A$  mátrix  $(i,j)$ -edik eleme

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár:  $\max(\text{size}(A))$
- $A(i, j)$  az  $A$  mátrix  $(i, j)$ -edik eleme
- $A(i, :)$  egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- $\text{size}(A)$  az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- $\text{length}(A)$  egy skalár:  $\max(\text{size}(A))$
- $A(i, j)$  az  $A$  mátrix  $(i, j)$ -edik eleme
- $A(i, :)$  egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora
- $A(:, j)$  egy oszlopvektor, az  $A$  mátrix  $j$ -edik oszlopa

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár: `max(size(A))`
- `A(i,j)` az  $A$  mátrix  $(i,j)$ -edik eleme
- `A(i,:)` egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora
- `A(:,j)` egy oszlopvektor, az  $A$  mátrix  $j$ -edik oszlopa
- `A(2:3,:)` az  $A$  mátrix 2. és 3. sora

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár: `max(size(A))`
- `A(i,j)` az  $A$  mátrix  $(i,j)$ -edik eleme
- `A(i,:)` egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora
- `A(:,j)` egy oszlopvektor, az  $A$  mátrix  $j$ -edik oszlopa
- `A(2:3,:)` az  $A$  mátrix 2. és 3. sora
- `A([1 2 4],:)` az  $A$  mátrix 1., 2. és 4. sora

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- `size(A)` az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- `length(A)` egy skalár: `max(size(A))`
- `A(i,j)` az  $A$  mátrix  $(i,j)$ -edik eleme
- `A(i,:)` egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora
- `A(:,j)` egy oszlopvektor, az  $A$  mátrix  $j$ -edik oszlopa
- `A(2:3,:)` az  $A$  mátrix 2. és 3. sora
- `A([1 2 4],:)` az  $A$  mátrix 1., 2. és 4. sora
- `A(:, [1 3])` az  $A$  mátrix 1. és 3. oszlopa

# Hivatkozás elemekre, sorokra, oszlopokra, részmatrixokra

- $\text{size}(A)$  az  $A$  mátrix mérete (egy kételemű sorvektor)
- $\text{length}(A)$  egy skalár:  $\max(\text{size}(A))$
- $A(i, j)$  az  $A$  mátrix  $(i, j)$ -edik eleme
- $A(i, :)$  egy sorvektor, az  $A$  mátrix  $i$ -edik sora
- $A(:, j)$  egy oszlopvektor, az  $A$  mátrix  $j$ -edik oszlopa
- $A(2:3, :)$  az  $A$  mátrix 2. és 3. sora
- $A([1\ 2\ 4], :)$  az  $A$  mátrix 1., 2. és 4. sora
- $A(:, [1\ 3])$  az  $A$  mátrix 1. és 3. oszlopa
- $A(2:3, [1\ 3])$  az  $A$  mátrix 2. és 3. sorának és 1. és 3. oszlopának metszetéből álló mátrix

# Mátrixok „átszabása”

## Sorok, oszlopok elhagyása mátrixokból

- $A(i, :) = []$  az  $i$ -edik sor elhagyása
- $A(:, j) = []$  a  $j$ -edik oszlop elhagyása

# Mátrixok „átszabása”

## Sorok, oszlopok elhagyása mátrixokból

- $A(i, :) = []$  az  $i$ -edik sor elhagyása
- $A(:, j) = []$  a  $j$ -edik oszlop elhagyása
- $A([1 \ 3], :) = []$  az 1. és 3. sor elhagyása
- $A(:, [1 \ 3]) = []$  az 1. és 3. oszlop elhagyása

# Mátrixok „átszabása”

## Sorok, oszlopok elhagyása mátrixokból

- $A(i, :) = []$  az  $i$ -edik sor elhagyása
- $A(:, j) = []$  a  $j$ -edik oszlop elhagyása
- $A([1 \ 3], :) = []$  az 1. és 3. sor elhagyása
- $A(:, [1 \ 3]) = []$  az 1. és 3. oszlop elhagyása

## Sor- és oszlopcseré

Az  $i$ -edik és  $j$ -edik sor illetve oszlop cseréje:

$$A([i, j], :) = A([j, i], :), \text{ ill. } A(:, [i, j]) = A(:, [j, i])$$

# Mátrixok „átszabása”

## Sorok, oszlopok elhagyása mátrixokból

- $A(i, :) = []$  az  $i$ -edik sor elhagyása
- $A(:, j) = []$  a  $j$ -edik oszlop elhagyása
- $A([1 \ 3], :) = []$  az 1. és 3. sor elhagyása
- $A(:, [1 \ 3]) = []$  az 1. és 3. oszlop elhagyása

## Sor- és oszlopcseré

Az  $i$ -edik és  $j$ -edik sor illetve oszlop cseréje:

$$A([i, j], :) = A([j, i], :), \text{ ill. } A(:, [i, j]) = A(:, [j, i])$$

## Mátrixból vektor

$A(:)$  az  $A$  mátrix elemei oszlopfolytonosan felsorolva

## Néhány beépített mátrix

$\text{eye}(n)$  az  $n \times n$ -es egységmátrix

$\text{eye}(n,m)$  az  $n \times m$ -es egységmátrix

## Néhány beépített mátrix

<code>eye(n)</code>	az $n \times n$ -es egységmátrix
<code>eye(n,m)</code>	az $n \times m$ -es egységmátrix
<code>ones(n)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times n$ -es mátrix
<code>ones(n,m)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times m$ -es mátrix

## Néhány beépített mátrix

<code>eye(n)</code>	az $n \times n$ -es egységmátrix
<code>eye(n,m)</code>	az $n \times m$ -es egységmátrix
<code>ones(n)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times n$ -es mátrix
<code>ones(n,m)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times m$ -es mátrix
<code>zeros(n)</code>	a csupa 0-ból álló $n \times n$ -es mátrix
<code>zeros(n,m)</code>	a csupa 0-ból álló $n \times m$ -es mátrix

## Néhány beépített mátrix

<code>eye(n)</code>	az $n \times n$ -es egységmátrix
<code>eye(n,m)</code>	az $n \times m$ -es egységmátrix
<code>ones(n)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times n$ -es mátrix
<code>ones(n,m)</code>	a csupa 1-esből álló $n \times m$ -es mátrix
<code>zeros(n)</code>	a csupa 0-ból álló $n \times n$ -es mátrix
<code>zeros(n,m)</code>	a csupa 0-ból álló $n \times m$ -es mátrix

## Néhány hasznos függvény

- `numel(A)` az  $A$  elemeinek száma
- `size(A)` az  $A$  mérete
- `length(A)` egyenlő `max(size(A))` értékével

# Műveletek vektorok és mátrixok között

Legyen  $A$  és  $B$  két mátrix (melyek akár vektorok is lehetnek),  $c$  egy skálár.  
Az

$$A+B, \quad A-B, \quad c*A, \quad A*B, \quad A^2$$

műveletek a hagyományos, lineáris algebrában értelmezett műveletek, feltéve, hogy  $A$  és  $B$  mérete megfelelő.

# Műveletek vektorok és mátrixok között

Legyen  $A$  és  $B$  két mátrix (melyek akár vektorok is lehetnek),  $c$  egy skálár.  
Az

$$A+B, \quad A-B, \quad c*A, \quad A*B, \quad A^2$$

műveletek a hagyományos, lineáris algebrában értelmezett műveletek, feltéve, hogy  $A$  és  $B$  mérete megfelelő. Az

$$A + c$$

művelet eredménye: az  $A$  minden eleméhez hozzáadunk  $c$ -t.

# Műveletek vektorok és mátrixok között

Legyen  $A$  és  $B$  két mátrix (melyek akár vektorok is lehetnek),  $c$  egy skalár.  
Az

$$A+B, \quad A-B, \quad c \cdot A, \quad A \cdot B, \quad A^2$$

műveletek a hagyományos, lineáris algebrában értelmezett műveletek, feltéve, hogy  $A$  és  $B$  mérete megfelelő. Az

$$A + c$$

művelet eredménye: az  $A$  minden eleméhez hozzáadunk  $c$ -t. Az

$$A/B \quad \text{és} \quad A \setminus B$$

műveletek eredménye  $A \cdot B^{-1}$  és  $A^{-1} \cdot B$ .

# Műveletek vektorok és mátrixok között

## Elemenkénti művelet

A műveleti jel előtti `.` jel a művelet elemenkénti végrehajtását eredményezi:

Az  $A.*B$  mátrix  $ij$ -edik eleme  $a_{ij} * b_{ij}$ ,

az  $A.^2$  mátrix  $ij$ -edik eleme  $a_{ij}^2$ ,

az  $A./B$  mátrix  $ij$ -edik eleme  $a_{ij}/b_{ij}$ .

A beépített Matlab függvények általában hívhatók mátrix argumentummal is, pl.  $\sin(A)$ ,  $\log(A)$ ,  $\exp(A)$ ,  $\text{abs}(A)$ , stb. Ilyenkor a függvény a mátrix minden elemére végrehajtódik.

## Feladatok

Legyen  $x = [-1 \quad 4 \quad 0]$ ,  $y = [3 \quad -2 \quad 5]$

és  $A = [-3 \quad 1 \quad -4; 6 \quad 2 \quad -5]$ . Döntse el, hogy az alábbi utasítások közül melyik végrehajtható. Ha nem végrehajtható, akkor magyarázza meg miért, ha végrehajtható, akkor fogalmazza meg mi lesz az eredmény!

(1)  $z = [x, y]$

(2)  $z = [x; y]$

(3)  $z = [x', y']$

(4)  $z = [x'; y']$

(5)  $z = [A; x]$

(6)  $z = [A, x]$

(7)  $z = [x; A; y]$

(8)  $z = [A'; x]$

(9)  $z = [A', x]$

(10)  $z = [A', x']$

(11)  $x + y$

(12)  $x + y'$

(13)  $A + y$

(14)  $A + 2$

(15)  $x/y$

(16)  $x./y$

(17)  $A \wedge 2$

(18)  $A. \wedge 2$

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

(1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,
- (3) elhagyjuk az  $A$  mátrix utolsó sorát és oszlopát

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,
- (3) elhagyjuk az  $A$  mátrix utolsó sorát és oszlopát
- (4) kétszer egymás mellé írjuk az  $A$  mátrixot,

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,
- (3) elhagyjuk az  $A$  mátrix utolsó sorát és oszlopát
- (4) kétszer egymás mellé írjuk az  $A$  mátrixot,
- (5) transzponáljuk az  $A$  mátrixot,

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,
- (3) elhagyjuk az  $A$  mátrix utolsó sorát és oszlopát
- (4) kétszer egymás mellé írjuk az  $A$  mátrixot,
- (5) transzponáljuk az  $A$  mátrixot,
- (6) felcseréljük az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát

## Feladat

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Konstruálja meg (az elemek felsorolása nélkül) azt a  $B$  mátrixot, melyet úgy kapunk, hogy

- (1) elhagyjuk az  $A$  mátrix első sorát,
- (2) elhagyjuk az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát,
- (3) elhagyjuk az  $A$  mátrix utolsó sorát és oszlopát
- (4) kétszer egymás mellé írjuk az  $A$  mátrixot,
- (5) transzponáljuk az  $A$  mátrixot,
- (6) felcseréljük az  $A$  mátrix 2. és 4. oszlopát
- (7) négyzetre emeljük az  $A$  elemeit

(8) az  $A$  minden elemét megnöveljük 3-mal

- (8) az  $A$  minden elemét megnöveljük 3-mal
- (9)  $A$  minden elemének vesszük a négyzetgyökét

- (8) az  $A$  minden elemét megnöveljük 3-mal
- (9)  $A$  minden elemének vesszük a négyzetgyökét
- (10)  $A$  minden elemének vesszük a szinuszát

- (8) az  $A$  minden elemét megnöveljük 3-mal
- (9)  $A$  minden elemének vesszük a négyzetgyökét
- (10)  $A$  minden elemének vesszük a szinuszát
- (11) az  $A$  első sorának második elemét kicseréljük  $-2$ -re

- (8) az  $A$  minden elemét megnöveljük 3-mal
- (9)  $A$  minden elemének vesszük a négyzetgyökét
- (10)  $A$  minden elemének vesszük a szinuszát
- (11) az  $A$  első sorának második elemét kicseréljük  $-2$ -re
- (12) az  $A$  2. sorát kicseréljük a  $[-1 \ 0 \ -2 \ 3]$  vektorra

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

- (1) `sum(A)`
- (2) `sum(A,2)`
- (3) `reshape(A,6,4)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

- (1) `sum(A)`
- (2) `sum(A,2)`
- (3) `reshape(A,6,4)`
- (4) `max(A)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

- (1) `sum(A)`
- (2) `sum(A,2)`
- (3) `reshape(A,6,4)`
- (4) `max(A)`
- (5) `max(A, [], 2)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

(3) `reshape(A,6,4)`

(4) `max(A)`

(5) `max(A, [], 2)`

(6) `max(A,2)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

(3) `reshape(A,6,4)`

(4) `max(A)`

(5) `max(A, [], 2)`

(6) `max(A,2)`

(7) `flipud(A)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

(3) `reshape(A,6,4)`

(4) `max(A)`

(5) `max(A, [], 2)`

(6) `max(A,2)`

(7) `flipud(A)`

(8) `fliplr(A)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

(3) `reshape(A,6,4)`

(4) `max(A)`

(5) `max(A, [], 2)`

(6) `max(A,2)`

(7) `flipud(A)`

(8) `fliplr(A)`

(9) `size(A)`

## Feladat

- Egy rövid Matlab utasítás segítségével állítsa elő az alábbi mátrixot!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 20 & 18 & 16 & 14 & 12 & 10 & 8 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 & 256 \end{pmatrix}$$

- Az előző feladat  $A$  mátrixával vizsgálja meg az alábbi utasítások eredményét!

(1) `sum(A)`

(2) `sum(A,2)`

(3) `reshape(A,6,4)`

(4) `max(A)`

(5) `max(A, [], 2)`

(6) `max(A,2)`

(7) `flipud(A)`

(8) `fliplr(A)`

(9) `size(A)`

(10) `length(A)`

# Lineáris algebra Matlab-bal

## Példa

Matlab segítségével döntse el, hogy a

$$a = \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix}$$

vektorrendszer lineárisan független-e!

# Lineáris algebra Matlab-bal

## Példa

Matlab segítségével döntse el, hogy a

$$a = \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix}$$

vektorrendszer lineárisan független-e!

**1. megoldás:** Készítsük el az alábbi  $A$  mátrixot:

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 2 & 3 \\ 5 & 11 & 10 \\ 9 & 7 & 6 \\ 4 & 14 & 15 \end{pmatrix}$$

majd a rank függvénnyel számítsuk ki a rangját.

**2. megoldás:** Az előző  $A$  mátrixszal hívjuk meg a `rref` függvényt!

```
>> R=rref(A)
```

```
R=
```

```
1 0 0
```

```
0 1 0
```

```
0 0 1
```

```
0 0 0
```

$R$  az  $A$  mátrixon végrehajtott Gauss-Jordan elimináció eredménye, ebből láthatjuk, hogy az  $A$  oszlopai lineárisan függetlenek.

## Példa

Döntse el, hogy az előző  $a$ ,  $b$ ,  $c$  vektorokhoz hozzávéve a  $d = (13, 8, 12, 1)^T$  vektort lineárisan független vektorrendszert kapunk-e?

## Példa

Döntse el, hogy az előző  $a$ ,  $b$ ,  $c$  vektorokhoz hozzávéve a  $d = (13, 8, 12, 1)^T$  vektort lineárisan független vektorrendszert kapunk-e?

**1. megoldás.** Egészítsük ki az  $A$  mátrixot a  $d$  oszlopvektorral:

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{pmatrix}$$

Ennek a mátrixnak a rangja:

```
>>rank(A)
```

```
ans=
```

```
3
```

Tehát a vektorrendszer nem független.

**2. megoldás.** Mivel a mátrix négyzetes, most a determinánsát is kiszámíthatjuk:

```
>>det(A)
ans=
-1.4494e-12
```

Ez azt jelenti, hogy a Matlab szerint a mátrix determinánsa  $\det(A) = -1.4494 \cdot 10^{-12}$ , ami közel van 0-hoz, de nem 0.

Ez a gépi számítás során bekövetkező hibákra vezethető vissza, ld. később.

### 3. megoldás. Használjuk újra az rref függvényt!

$R = \text{rref}(A)$

$R =$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Ez azt jelenti, hogy a vektorrendszer lineárisan függő, sőt azt is megkaptuk, hogy  $d = a + 3b - 3c$ .

## Feladat

- Keresünk két lineárisan független vektort a

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

vektorrendszerben, és a másik két vektort írjuk fel ezek lineáris kombinációjaként.

## Feladat

- Keresünk két lineárisan független vektort a

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

vektorrendszerben, és a másik két vektort írjuk fel ezek lineáris kombinációjaként.

- Keresünk három lineárisan független vektort a

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

vektorrendszerben, és a negyedik vektort írjuk fel ezek lineáris kombinációjaként.

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert Matlab-bal, ha

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -12 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert Matlab-bal, ha

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -12 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.** Használjuk a Matlab backslash operátort!

```
>>A=[-2 -1 4; 2 3 -1; -4 -10 -5];
```

```
>>b=[3; 1; -12];
```

```
>>x=A\b
```

```
x=
```

```
3
```

```
-1
```

```
2
```

**Ügyeljünk rá, hogy a b oszlopvektorként legyen megadva!**

Ha az egyenletrendszer kibővített mátrixával meghívjuk az `rref` függvényt:

```
>>rref([A b])
```

```
ans=
```

```
1 0 0 3
0 1 0 -1
0 0 1 2
```

akkor láthatjuk, hogy a Gauss-Jordan elimináció eredményeként valóban így állítható elő a  $b$  vektor az  $A$  oszlopvektoraiból, amelyek lineárisan függetlenek, tehát a megoldás egyértelmű.

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert Matlab-bal, ha

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 2 \\ -2 & -7 & 3 \\ 2 & 12 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -13 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert Matlab-bal, ha

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 2 \\ -2 & -7 & 3 \\ 2 & 12 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -13 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.** Próbálkozzunk ismét a backslash operátorral!

```
>>A=[-4 -4 2; -2 -7 3; 2 12 -5];
```

```
>>b=[-2; 6; -13];
```

```
>>x=A\b
```

```
Warning: Matrix is singular to working precision
```

```
x=
```

```
NaN
```

```
NaN
```

```
NaN
```

A Matlab arra figyelmeztetett, hogy a mátrix szinguláris (valóban,  $\det(A) = 0$ ), és ezzel a módszerrel nem sikerült meghatározni  $x$ -et.

A Matlab arra figyelmeztetett, hogy a mátrix szinguláris (valóban,  $\det(A) = 0$ ), és ezzel a módszerrel nem sikerült meghatározni  $x$ -et.

Próbálkozzunk az `rref` függvénnyel!

```
>>rref([A b])
```

```
ans=
```

```
1.0000    0 -0.1000    1.9000
      0    1.0000 -0.4000   -1.4000
      0      0      0      0
```

Azt látjuk, hogy a mátrix oszlopvektorai lineárisan függőek, de a  $b$  vektor benne van az oszlopvektorok által felfeszített térben. Tudjuk, hogy ilyenkor az egyenletrendszernek végtelen sok megoldása van, ezek közül egy:

$$x = \begin{pmatrix} 1.9 \\ -1.4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ha az egyenletrendszer összes megoldását szeretnénk tudni, akkor használjuk a `null` függvényt, amely előállítja a nulltér egy bázisát:

```
>>p=null(A, 'r')
```

```
p=
```

```
1/10
```

```
2/5
```

```
1
```

(az `'r'` opció hatására a vektor racionális alakban jelenik meg)

Ha az egyenletrendszer összes megoldását szeretnénk tudni, akkor használjuk a `null` függvényt, amely előállítja a nulltér egy bázisát:

```
>>p=null(A, 'r')
```

```
p=
```

```
1/10
```

```
2/5
```

```
1
```

(az `'r'` opció hatására a vektor racionális alakban jelenik meg)  
Ezek szerint a lineáris egyenletrendszer általános megoldása:

$$\begin{pmatrix} 1.9 \\ -1.4 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1/10 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ahol  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

## Feladat

Oldja meg Matlab-bal az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

- $$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -5 \\ 24 \\ -23 \end{pmatrix}$$

- $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 0 \\ -3 & 4 & -13 & 22 \\ 5 & -1 & 16 & -14 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 81 \\ -33 \\ 15 \end{pmatrix}$$

**Hasznos:** ha az  $x$  racionális elemű vektor koordinátáit nem tizedestört alakban akarjuk látni, akkor használhatjuk a `rats(x)` utasítást, vagy a kiiratás formátumát állítsuk át a `format rat` paranccsal

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}$$

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszert, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.** A backslash operátorral azt kapjuk, hogy

```
>>x=A\b
```

```
x=
```

```
1.0000
```

```
2.7000
```

Könnyen látható, hogy ez **nem megoldása** az egyenletrendszernek.

Az rref függvénnyel:

```
>>rref([A b])
```

```
ans=
```

```
1 0 0
```

```
0 1 0
```

```
0 0 1
```

```
0 0 0
```

láthatjuk, hogy az alaplátrix rangja 2, a kibővített mátrixé 3, az egyenletrendszer **túlhatározott**.

Az rref függvénnyel:

```
>>rref([A b])
```

```
ans=
```

```
1 0 0
```

```
0 1 0
```

```
0 0 1
```

```
0 0 0
```

láthatjuk, hogy az alaplátrix rangja 2, a kibővített mátrixé 3, az egyenletrendszer **túlhatározott**.

**Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek esetén a backslash operátor egy olyan  $x$  vektort ad vissza, melyre az  $Ax$  és  $b$  vektorok eltérése euklideszi normában a legkisebb (azaz  $\|Ax - b\|_2$  minimális).**

Ilyenkor azt mondjuk, hogy  $x$  az egyenletrendszer legkisebb négyzetes értelemben vett megoldása.

# Több jobboldali vektor

## Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  és  $Ax = c$  egyenletrendszereket, ha

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -12 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 17 \\ 1 \\ -42 \end{pmatrix}$$

## Több jobboldali vektor

### Példa

Oldjuk meg az  $Ax = b$  és  $Ax = c$  egyenletrendszereket, ha

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -12 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 17 \\ 1 \\ -42 \end{pmatrix}$$

**Megoldás.** Mivel a két rendszer mátrixa azonos, ezért megoldhatjuk őket egyszerre.

```
>>A=[-2 -1 4; 2 3 -1; -4 -10 -5];
```

```
>>b=[3; 1; -12]; c=[17; 1; -42];
```

```
>>x=A\[b c]
```

```
x=
```

```
 3  -2  
-1   3  
 2   4
```

## Több jobboldali vektor

Nagyméretű mátrixok esetén a futási időt jelentősen befolyásolhatja, hogy az azonos jobboldallal adott rendszereket egyszerre, vagy külön-külön oldjuk meg:

```
>> A=rand(10000);  
>> b=ones(10000,1);  
>> c=zeros(10000,1);  
>> tic;x=A\[b,c];toc  
Elapsed time is 6.116513 seconds.  
>> tic;x=A\b; x2=A\c; toc  
Elapsed time is 11.571959 seconds.
```

(A fenti eredmény egy Intel Core i5-4590 processzorral, 7.7 GiB memóriával rendelkező gépen született).

## Több jobboldali vektor

Ha több rendszert kell megoldanunk, ahol a mátrix azonos, a jobboldali vektorok különbözőek, de a jobboldali vektorok nem állnak egyszerre rendelkezésre, akkor a következő utasításokat használjuk:

Egyetlen egyszer, a rendszerek megoldása előtt adjuk ki az

```
>> [L,U]=lu(A);
```

utasítást.

Ahányszor egy újabb  $b$  jobboldali vektor rendelkezésünkre áll, adjuk ki az

```
>> x=U\ (L\b);
```

utasítást, amivel megkapjuk az adott jobboldali vektor esetén a rendszer megoldását.

# Mátrix inverze Matlab-bal

Az `inv` függvénnyel számítható. Ha a mátrix nem négyzetes, vagy a determinánsa 0 (vagy 0-hoz közeli), akkor hibaüzenetet, illetve figyelmeztetést kapunk.

**Nagyméretű mátrixok inverzének kiszámítása túl költséges lehet. Csak akkor számoljuk ki, ha ténylegesen szükségünk van az inverzre.**

Pl. az  $Ax = b$  négyzetes mátrixú lineáris egyenletrendszer megoldása  $x = A^{-1}b$  módon kb háromszor annyi műveletbe kerül, mint az  $x = A \setminus b$  megoldás.

# Sajátérték, sajátvektor

## Feladat

(1) *Határozza meg az alábbi mátrixok sajátértékeit, sajátvektorait!*

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -6 & 2 & -2 \\ 15 & 5 & 7 \\ 21 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

## Feladat

(2) *Határozza meg az alábbi mátrixok sajátértékeit, sajátvektorait!*

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 2 \\ 8 & -6 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

# Sajátérték, sajátvektor Matlab-bal

## Példa

Határozzuk meg az

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -2 \\ 15 & 5 & 7 \\ 21 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

mátrix sajátértékeit, sajátvektorait!

# Sajátérték, sajátvektor Matlab-bal

## Példa

Határozzuk meg az

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -2 \\ 15 & 5 & 7 \\ 21 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

mátrix sajátértékeit, sajátvektorait!

**Megoldás.** Használjuk az eig függvényt!

`u=eig(A)`

egy  $u$  vektorral tér vissza, melynek elemei az  $A$  sajátértékei

`[V,U]=eig(A)`

Két mátrixszal tér vissza, az első mátrix oszlopvektorai az  $A$  sajátvektorai, a második mátrix diagonálisában lévő értékek az  $A$  sajátértékei (a sajátvektoroknak megfelelő sorrendben).

```
>> [V,U]=eig(A)
```

```
V=
```

```
-0.0000 -0.5345 -0.3651  
-0.7071  0.2673 -0.1826  
-0.7071  0.8018  0.9129
```

```
U=
```

```
12.0000         0         0  
         0 -4.0000         0  
         0         0 -0.0000
```

Tehát az  $A$  sajátértékei 12,  $-4$ , 0, a megfelelő sajátvektorok a  $V$  oszlopvektorai.

## Feladat

Határozza meg Matlab-bal az alábbi mátrixok sajátértékeit, sajátvektorait!



$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$



$$B = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$